

12. V GE krystaly většinou ve tvaru širokých jehel, postupně se zužujících do úzkých, ale často tupých vrcholů (obr. 10); v GAW krystaly ve formě jemných jehel (obr. 9 - kys. grayanová); pohárky dlouze stopkaté, obvykle sorediózní .....  
 ..... C. *grayi* G.K. Merrill ex Sandst. (široce rozšířená)  
 - V GE krystaly jehlovité, nebo širší a postupně se zužující do ostrých konců, často špičkami pohromadě ve vějířovitých sluchcích (obr. 12); v GAW podobné, nebo štihlé, rovné nebo zahnuté jehly mohou převažovat (obr. 11 - sferoforin); pohárky někdy skoro přisedlé, soredie chybí ..... C. *imbricaria* Krist.  
 (udávána pouze z Islandu, Norska a Wyomingu)  
 [Z Brit. Lichen Soc. Bull. 70, 1992 přeloženo se svolením autora, mírně zkráceno]

## ZAJÍMAVÉ NÁLEZY

*Acaulon triquetrum* (Spruce) C. Müll. - Česká rep.: Praha, CHPV Podbabské skály, na zemi, ca 200 m, c. spor., 26.3.1994 leg. J. Váňa, herb. J. Váňa. Vzácný atlantsko-mediteránní mech; z území Velké Prahy naposledy doložen sběry Velenovského a Podpěry z r. 1903 (cf. Pospíšil, Čas. Morav. Mus. 63, 1978).

*Fontinalis squamosa* Hedw. - Česká rep.: Chebská pánev, obec Kaceřov, Libocký potok, na kamenech v potoce S obce, 450 m, steril., 27.8.1991 leg. P. Nevečeřal, herb. P. Nevečeřal. Vzácnější vodní mech dosud sbíraný v západních Čechách jen v Brdech a na Šumavě (cf. Vondráček, Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír. 83, 1992).

*Orthodontium lineare* Schwaegr. - Česká rep.: Šumava, rez. Obří hrad nad osadou Popelná (asi 14 km JJV Sušice), okraj suti při vrcholu, na zemi, c. spor., ca 960 m, 18.8.1993 leg. J. Liška, herb. PRC. - Šumava, kar. Černého jezera, ca 1380 m, 10.6.1994 leg. J. Váňa, herb. J. Váňa. - Podyjí, obce Konice, Trauznické údolí (0,7 km SZ obce), na tlejícím kmenu olše, c. spor., ca 270 m, 7.9.1993 leg. Z. Hradílek, det. L. Pujmanová, herb. Z. Hradílek et BRNM. Invazní druh mechu šířící se ze západní Evropy na východ; v Čechách poměrně hojně rozšířen (cf. Bryonora 8, 1992), ale na Šumavě dosud nenalezen; nález v Podyjí je asi prvním na Moravě (ze Slovenska dosud znám ze dvou lokalit).

*Rhynchostegiella tenella* (Dicks.) Limpr. - Česká rep.: Podorličí, Ústí n. Orlicí, stinná opuková skalka na levém břehu Tiché Orlice poblíž žel. zast. Bezpráví (ca 5 km SZ Ústí n. O.), 330 m, c. spor.!, 6.5.1994 leg. Z. Soldán, herb. Z. Soldán. U Ústí n. O. sbíral tento zřejmě mizející mech Velenovský v r. 1895 a Podpěra v r. 1898. Od r. 1950 byl v bývalém Československu sbírán jen 9x. Poslední nález se sporogony byl učiněn před více než 50ti (!) lety v Moravském krasu (cf. Pospíšil, Acta Mus. Moraviae 76, 1991).

*Torula latifolia* Bruch ex Hartm. - Česká rep.: Podorličí, Ústí n. Orlicí, na levém břehu Tiché Orlice u mostku asi 1 km J žel. zast. Bezpráví, na k řece přivrácené borce vrby (*Salix fragilis*), steril., 310 m, 6.5.1994 leg. Z. Soldán, herb. Z. Soldán. Velmi silně ohrožený druh mechu dosud ve vých. Čechách sbírán poblíž Pardubic (1901) a Hradce Králové (1932) (cf. Pospíšil, Acta Mus. Moraviae 72, 1987).

*Lecanactis abscondita* (Th.Fr.) Lojka - Slovenská rep. (6884c): Liptovské Tatry, Zdiarská dol., na zastíněné rulové skalce, ca 1000 m, 28.5.1984 leg. J. Liška, det. J.M. Egea & P. Torrente. Vzácný lišejník, z ČR neudáván.